

## Statique des fluides



### Questions de cours

Pour apprendre le cours : vérifiez que vous savez répondre à chaque question.


1. Définir force volumique et force surfacique. Illustrer avec la force de pesanteur et la force de pression.
2. Définir le champ de pression.
3. Donner et démontrer la relation de la statique des fluides dans le champ de pesanteur.
4. Donner et démontrer l'expression du champ de pression dans un fluide incompressible.
5. Donner et démontrer l'expression du champ de pression dans l'atmosphère isotherme.
6. Que peut-on dire de l'ordre de grandeur de variation de la pression dans le cas de l'océan et dans le cas de l'atmosphère.
7. Calculer la résultante des forces pressantes sur une paroi plane soumise à la pression hydrostatique.
8. Calculer la résultante des forces pressantes sur un barrage cylindrique (schéma et paramétrage fourni).
9. Qu'est-ce que la poussée d'Archimède ?



### Exercices de cours - Savoirs-Faire

#### SF 1 - Exploiter l'expression de la pression hydrostatique

On verse de l'eau dans un tube en  $U$  de section  $1 \text{ cm}^2$ . On ajoute ensuite dans la branche de droite  $3 \text{ mL}$  de l'huile de masse volumique  $800 \text{ kg.m}^{-3}$ . Déterminer la différence d'altitude entre les surfaces libres des deux branches.



#### SF 2 - Calculer une résultante des forces sur des solides de différentes géométries

##### Surface plane


Reprendre l'application du cours (paroi de la piscine)

### Surface cylindrique

Reprendre l'application du cours (barrage voûte)

### Surface sphérique

On considère une ventouse qu'on modélise par une demi-sphère. Après avoir chassé une partie de l'air sous le dôme, on suppose que la pression est alors  $\frac{P_{atm}}{2}$  sous le dôme et  $P_{atm}$  à l'extérieur.



Déterminer la force résultante des forces de pression sur la ventouse.



### Exercices phares

#### Exercice 1 - Ballon sonde

Un ballon sonde est assimilé à une sphère indéformable de rayon  $R_0 = 2$  m remplie d'hélium, ouverte par le bas, ce qui permet à l'hélium de s'échapper au fur et à mesure de l'ascension et au ballon de demeurer en équilibre thermique et mécanique avec l'atmosphère.

Le ballon de masse à vide 1 kg est conçu pour emporter des équipements scientifiques. La température de l'atmosphère suit la loi  $T(z) = T_0(1 - \alpha z)$  avec  $\alpha = 2.10^{-5} \text{ m}^{-1}$ .

1. Déterminer la constante  $\beta$  telle que le champ de pression atmosphérique s'écrive


$$P(z) = P_0(1 - \alpha z)^\beta$$

2. En déduire l'évolution de la masse volumique de l'air avec l'altitude.
3. Déterminer la masse d'hélium restant dans le ballon en fonction de l'altitude.
4. En déduire la masse maximale que peut soulever le ballon à l'altitude  $z$ .
5. Application numérique : calculer cette masse au niveau du sol et à 10 km d'altitude.

Données :

- ▷ Masse molaire de l'air 29,0 g.mol<sup>-1</sup> et de l'hélium 4,0 g.mol<sup>-1</sup>
- ▷ Constante des gaz parfaits  $R = 8,3 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$ ;

#### Exercice 2 - Tube à essai



On considère un tube à essais rempli d'un liquide incompressible de masse volumique  $\rho$ . On raisonne sur un axe vertical  $z$  descendant dont l'origine se trouve comme indiqué sur le schéma ci-contre.

1. Calculer la pression  $P(z)$ .
2. Donner sans calcul la direction de la résultante des forces de pression subies par le tube.
3. Faire le calcul. Commenter.

Aides au calcul :

$$\int \cos(\theta) \sin(\theta) d\theta = -\frac{\cos(2\theta)}{4} + cste$$

$$\int \cos^2(\theta) \sin(\theta) d\theta = -\frac{\cos^3(\theta)}{3} + cste$$




## Exercices en plus

### Exercice 3 - Ressort et tube en U

Pour réviser un peu la mécanique de PTSI avec le ressort, exercice classique

On dispose dans un tube en  $U$  un bouchon de masse  $m$  et de section  $S$  égale à la section du tube dans lequel il oscille sans frottement. Un ressort de raideur  $k$  est accroché d'une part au bouchon et d'autre part à un point fixe, voir figure ci dessous. Une graduation se trouve à une hauteur  $h$  au dessus de la position initiale du bouchon. On note  $\Delta\ell_0$  son allongement dû à la pesanteur.




On remplit le tube d'un liquide de masse volumique  $\rho$  inconnue jusqu'à la graduation. Le bouchon remonte de  $\Delta z$  par rapport à sa position initiale. On note  $P$  la pression au niveau du point  $M$  et  $P_{\text{atm}}$  la pression atmosphérique.

1. Déterminer l'expression de  $\Delta\ell_0$  en fonction de  $k$  et  $m$ .
2. Écrire l'équation d'équilibre du bouchon en fonction des pressions et de  $\Delta z$ .
3. Déterminer l'expression de  $\rho$  en fonction des données du problème.
4. Calculer  $\rho$  pour un tube de diamètre  $d = 2$  cm, avec  $\Delta z = 1$  cm,  $h = 10,7$  cm et  $k = 30$  N/m.

### Exercice 4 - Oscillations d'un flotteur

Pour s'entraîner sur la poussée d'Archimède



On modélise un flotteur (bouchon de pêche, bouée, etc.) par un cylindre de masse volumique  $\rho$  plongeant partiellement dans l'eau de masse volumique  $\rho_0 > \rho$ . On suppose son axe de révolution constamment vertical.

1. Déterminer la hauteur immergée à l'équilibre.
2. Quelle est la force à exercer sur le flotteur pour l'immerger en entier ?
3. À partir de la position d'équilibre déterminée précédemment, on enfonce légèrement le cylindre avant de le relâcher. Montrer que le cylindre effectue des oscillations et déterminer leur période.

**Exercice 5 - Bulle***Pression hydrostatique*


Un plongeur libère une bulle de 1 cm de diamètre à 100 m de profondeur. Quel sera le diamètre de la bulle lorsqu'elle arrivera à la surface ?

**Exercice 6 - Troposphère***Un autre modèle pour une partie de l'atmosphère*

La troposphère est la couche d'atmosphère comprise entre le sol et une altitude moyenne d'environ 10 km sous les latitudes européennes. On s'intéresse au profil vertical de la température  $T(z)$ ,  $z$  étant la coordonnée verticale ascendante dont l'origine est située au niveau du sol. On assimile l'air troposphérique à un gaz parfait de masse volumique  $\rho(z)$ .

On note  $\gamma$  le rapport  $\frac{C_p}{C_v}$  des capacités thermiques du gaz à pression et volume constante respectivement  $C_p$  et  $C_v$ . On négligera la variation avec  $z$  du champ de pesanteur  $g$ . La pression est notée  $p$ ; sa valeur au niveau du sol est  $10^5$  Pa.

1. Exprimer la pression  $p$  d'une masse d'air en fonction de sa masse volumique  $\rho$ , de sa température  $T$ , de la constante des gaz parfaits  $R$  et de la masse molaire de l'air  $M_{\text{air}}$ .
2. Dans le modèle de l'atmosphère isentropique, on considère que la pression  $p$  et la température  $T$  à une altitude  $z$  quelconque sont liées à leurs valeurs  $p_0$  et  $T_0$  au niveau du sol par la loi de Laplace. Donner la relation entre  $p$ ,  $T$ ,  $p_0$  et  $T_0$ .
3. Exprimer  $\frac{dT}{dz}$  en fonction de  $\gamma$ ,  $M_{\text{air}}$ ,  $\rho$ ,  $R$  et  $\frac{dp}{dz}$ .
4. Montrer que  $T(z) = T_0 \left(1 - \frac{z}{H}\right)$ , où  $H$  est à déterminer.
5. Déterminer  $\rho(z)$ . On notera  $\rho_0 = \rho(z=0)$ .
6. Déterminer numériquement  $\frac{dT}{dz}$  et  $H$  si  $\gamma = 1,4$  et  $T_0 = 290$  K.

**Exercice pour aller plus loin \*\*\*****Exercice 7 - Plaque pivotante**

1. Exprimer la pression dans l'eau.
2. La pression sur la plaque horizontale est-elle uniforme ? Exprimer la résultante des forces de pression sur la plaque horizontale et le moment résultant autour de  $(Oz)$ .
3. Mêmes questions pour la plaque verticale.
4. A quelle condition sur la hauteur d'eau y a-t-il basculement ? Déterminer la hauteur  $h_0$  pour laquelle la plaque bascule.

Les deux parois du récipient ci-contre dessinées en traits épais sont rigidement liées et peuvent pivoter sans frottement autour de l'axe  $(Oz)$ . Le récipient est parallélépipédique et possède une longueur  $b$  dans la direction  $(Oz)$ . On note  $P_0$  la pression dans l'air environnant et  $\vec{g} = -g\vec{e}_y$